

КАК РАЗВИВАЕТСЯ БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ЦИСТИТ?

- 

Бактерия попадает в мочевой пузырь или мочевой тракт. В таком состоянии она еще не может навредить организму.
- 

На поверхности стенки бактерии есть специальные реснички или жгутики – фимбрии (пили). Они вырабатывают специфический белок – адгезин.
- 


Белок адгезин связывается с рецепторами на поверхности клеток, выстилающих мочевой пузырь.
- 

Бактерия прикрепилась к слизистой! С этого момента она начинает выделять в клетки мочевого пузыря токсины, «забирать» из клеток полезные вещества и размножаться.
- 


Клетки мочевого пузыря повреждаются и гибнут. Начинается цистит.


ЦИСТЕНИУМ II: ТРОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ КОМПОНЕНТОВ


Компоненты Цистениума II нарушают механизм «заселения» бактериями мочевого пузыря, и потому воздействуют непосредственно на причину развития цистита:




ЦИСТЕНИУМ II: ВНИМАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД К ЗАЩИТЕ

- 

Активные компоненты Цистениума II действуют на одну и ту же «мишень», что повышает эффективность защиты.
- 

Эффективность не снижается при длительном приеме, так как у бактерий не формируется устойчивость (резистентность) к действию растительных компонентов.
- 


Высокий профиль безопасности: можно принимать беременным женщинам и детям с 7 лет.
- 

Не содержит ароматизаторов, красителей, консервантов, подсластителей.

SYSTEMIUM ЦИСТЕНИУМ II

для защиты мочевыводящих путей

КАК ПРИНИМАТЬ?


- 


Детям старше 7 лет и взрослым по 1 таблетке 1–2 раза в день во время еды. Продолжительность приема – 2 недели. При необходимости курс приема повторить. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Перед применением детьми необходимо проконсультироваться с врачом-педиатром. Беременным и кормящим женщинам принимать по назначению и под наблюдением врача.


СОВЕТЫ ПО ПРИЕМУ**:

- Можно рассасывать таблетку, запивая водой или другим напитком (в том числе сладким).
- Если сложно рассосать таблетку, ее допустимо растолочь и растворить в половине стакана воды, а затем выпить полученный напиток. Можно подсластить по вкусу.
- Для удобства приема таблетку можно разделить на несколько частей, которые затем следует рассосать, разжевать или проглотить, запивая водой.
- Допустимо разжевать таблетку.

КОГДА ПРИНИМАТЬ?

- 

Для большей эффективности один прием Цистениума II желательно запланировать на вечернее время, так как ночью моча застаивается и возникает благоприятная среда для размножения микроорганизмов.
- 

Непосредственно после возникновения факторов риска можно провести один курс приема Цистениума II (2 недели). Если циститы повторяются, целесообразно принимать Цистениум II в течение более длительного времени.
- 

Цистениум II совместим с антибактериальными препаратами и другими средствами для терапии цистита.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ЭКСТРАКТ КЛЮКВЫ EXOSUAN™

- Exosuan™ – это уникальный стандартизированный экстракт клюквы, который производит компания Nexira в г. Бордо, Франция.
- Экстракт клюквы Exosuan™ стандартизирован по проантоцианидинам (уникальные технологии позволяют выделить из клюквы проантоцианидины А), которые доказанно уменьшают вероятность (риск) инфекций мочевыводящих путей.

Биологически активная добавка к пище «ЦИСТЕНИУМ II». Не является лекарством.

Форма выпуска: таблетки для рассасывания массой 1800 мг.

Состав: лактоза моногидрат, D-манноза, экстракт плодов клюквы, аскорбиновая кислота (витамин С), антислежжающие агенты – магния стеарат, кремния диоксид аморфный, носитель – стеариновая кислота.

Прием 1–2 таблеток обеспечит поступление:

Наименование компонента	Количество, мг	Дети, %		
		7–11 лет	11–14 лет	14–18 лет
Витамин С	60–120	100–200 ^{1*}	86–171 ^{1*} (м) 100–200 ^{1*} (д)	67–133 ^{1*} (м) 86–171 ^{1*} (д)
Проантоцианидины	36–72	–		
D-манноза	450–900	–		

Наименование компонента	Количество, мг	Женщины, %			Взрослые, %
		Беременные (I-я половина)	Беременные (II-я половина)	Кормящие	
Витамин С	60–120	67–133 ^{1*}	60–120 ^{1*}	50–100 ^{1*}	100–200 ^{2*}
Проантоцианидины	36–72	36–72 ³			
D-манноза	450–900	–			

¹ – % согласно МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации».

² – % от рекомендуемого уровня суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011 (Приложение 2).

³ – % от адекватного уровня потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контроль)» (Приложение 5).

* – не превышает верхний допустимый уровень потребления.

m – мальчики / д – девочки.

Пищевая ценность в 1 таблетке: углеводы – 1,6 г.

Энергетическая ценность в 1 таблетке: 27 кДж / 6,4 ккал.

Область применения: рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника витамина С, содержащей проантоцианидины.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

Условия хранения: в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °С.

Реализация: через аптечные учреждения, специализированные магазины по продаже диетических продуктов, специальные отделы продовольственных магазинов.

Срок годности: 3 года.

ТУ 10.89.19-157-58693373-2019

СГР № RU.77.99.11.003.R.003791.10.19 от 16.10.2019 г.

Изготовитель: ООО «ВТФ», РФ, 601125, Владимирская обл., Петушинский р-н, пос. Вольгинский, ул. Заводская, стр. 107.

Организация, уполномоченная на принятие претензий:

АО «АКВИОН», РФ, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, 8 этаж, помещение IN – комната 11. Тел.: +7 (495) 780-72-34. Телефон горячей линии: 8-800-200-86-86. Все права на продукт принадлежат АО «АКВИОН».

Поставщик и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей в Республике Беларусь: ОДО «ФАРМИН», РБ, 220125, г. Минск, пр-т Независимости, 177-62, тел.: (017) 269-88-00.

** Советы носят рекомендательный характер, не обязательны к исполнению. Exosuan™ является товарным знаком компании Nexira.